

Bakgrundsinformation om Livial®

Livial®

Livial® (tibolon) är ett läkemedel som användes för att lindra klimakteriebesvär och för att förebygga benskörhet. Det ges till kvinnor som passerat menopaus och är ett alternativ till konventionell hormonbehandling (östrogen/gestagen). Minst ett år ska ha gått sedan kvinnan haft sin sista menstruationsblödning. Läkemedlet är i tablettform.

Tibolon

Den aktiva substansen i Livial heter tibolon. Tibolon har östrogena, gestagena och androgena effekter. Behandling med Livial är vävnadsselektiv. Det innebär att behandlingen har olika effekt på olika organ i kvinnans kropp. Detta skiljer Livial från annan hormonbehandling.

Tibolon verkar via tre metaboliter (produkter som bildas vid ämnesomsättningen i kroppen). Dessa metaboliter ger olika effekt på olika organ. Två metaboliter har östrogen effekt på centrala nervsystemet, på slidan och i benvävnad. Den tredje metaboliten har gestagen effekt på slemhinnan i livmodern.

Den östrogena effekten på centrala nervsystemet ökar välbefinnandet och minskar vallningar och svettningar. I slidan innebär den östrogena effekten att tjockleken och elasticiteten i slemhinnan ökar och att torrhetskänsla och problem med urinvägsinfektioner minskar. Den östrogena effekten på benvävnaden innebär att urkalkningen av skelettet minskar. Den gestagena effekten på livmodern, håller slemhinnan tunn.

Likheter och skillnader mellan behandling med Livial och östrogen/gestagen

Livial är lika effektiv som konventionell östrogenbehandling när det gäller att lindra klimakteriebesvär och har samma positiva effekt på urkalkningen av skelettet. Eftersom Livial påverkar slemhinnan i livmodern så att den blir tunn, behöver inga blödningar framkallas. En kvinna som använder Livial slipper alltså mellanblödningar, så snart hennes kropp anpassat sig till behandlingen.

Kvinnor som använder Livial upplever mindre bröstspänningar än kvinnor som behandlas med östrogen/gestagen. Det har också visat sig att mammografibilderna blir klara och inte blir mjölkvita och täta som för kvinnor som använder östrogen.

Livial påverkar också sexlusten positivt, så att förlorad sexlust kan återvända. Biverkningarna är de samma som vid andra typer av hormonbehandling. Vissa kvinnor kan få svullnad av vätskeansamling, bröstspänning och illamående. Dessa besvär brukar minska inom tre månader, när kroppen vant sig.

Biverkningar

Biverkningarna är de samma som vid andra typer av hormonbehandling. Vissa kvinnor kan få svullnad av vätskeansamling, bröstspänning och illamående. Dessa besvär brukar minska inom tre månader, när kroppen vant sig.

Källor:

www.fass.se
www.organon.se
www.livial.nu
www.livial.md

För mer information om Livial, besök www.livial.nu, www.fass.se eller www.schering-plough.se