

MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på [www.msd.se](http://www.msd.se)

*fertilitetsguiden.nu*

**ORGALUTRAN®** (ganirelix). Injektionsvätska, lösning 0,25 %. Farmakoterapeutisk grupp: Gonadotropinantagonister, H01C C01. Prevention av prematura stegringar av luteiniseringshormon (LH) hos kvinnor som genomgår kontrollerad ovariell hyperstimulering (COH) för assisterad befruktning (ART). I kliniska studier användes Orgalutran i kombination med rekombinant humant follikelstimulerande hormon (FSH). Förpackningar: 1 st förfylld spruta, 5 st förfyllda sprutor. Ingår i förmånssystemet. Rx. Datum för senaste översyn av produktresumé: Januari 2008. För ytterligare information och pris, se [www.fass.se](http://www.fass.se).



MSD, Box 7125, 192 07 Sollentuna  
Telefon 08-626 14 00. [www.msd.se](http://www.msd.se)

Ngrtngpln\_FER04\_sopnember\_2010



## Instruktion för dig som ska använda Orgalutran®



Ofrivillig barnlöshet är ett problem som delas av mer än en halv miljon personer i Sverige. Många har en önskan om att få barn och när denna önskan inte uppfylls kan det upplevas påfrestande. Med modern teknologi och nya läkemedel finns det idag möjlighet för många par att bli hjälpta.

Orgalutran® förebygger en för tidig frisättning av hormonet LH (luteiniseringshormon). Den här instruktionsfoldern visar hur du använder Orgalutran.

Puregon® (follitropin beta) från Schering-Plough är ett FSH-preparat (follikelstimulerande hormon) som används för att under kontrollerade former stimulera mognaden av ägg. För Puregon finns en motsvarande instruktion tillgänglig.

### Vad är Orgalutran?


Orgalutran är en s.k. GnRH-antagonist. Orgalutran finns färdigblandat i en förfylld spruta. Därmed är det enkelt att administrera. Orgalutran ges tillsammans med Puregon och finns tillgängligt i förpackningar med en eller fem sprutor.

### Hur används Orgalutran?


1. Orgalutran injiceras en gång dagligen, ungefär vid samma tidpunkt.
2. Läkaren bestämmer vilken dag du ska börja använda Orgalutran.
3. Orgalutran injiceras i huden nedanför naveln. Variera injektionsstället varje dag. Använd olika injektionsställen för Puregon och Orgalutran.
4. Du får information av läkare eller barnmorska om tidpunkten för den sista Orgalutraninjektionen.

### Hur skall Orgalutran förvaras?


Orgalutran är ljuskänsligt och ska förvaras i förpackningen i rumstemperatur. Se till att det förvaras utom räckhåll för barn.



Ta fram förpackningen med Orgalutran. Kontrollera alltid lösningen innan den används. Lösningen ska vara fri från partiklar.



Orgalutran ska injiceras under huden. Det bästa injektionsstället är huden strax nedanför naveln, till höger eller vänster. Variera gärna stickstället från dag till dag. Det är inte nödvändigt att desinficera stickstället.



Lyft upp injektionsstället genom att klämma huden mellan tummen och pekfingeret. Håll sprutan som en penna och för in hela nålen med ett bestämt stick vinkelrätt, som din sköterska demonstrerat för dig. Töm sprutan genom att sakta och jämnt trycka in kolven. Drag därefter ut nålen och torka injektionsstället.

För mer information om Orgalutrans användningsområde och verkningsätt, se bipacksedel i förpackningen.