

Forma de utilizar Orgalutran®

La **infertilidad involuntaria** es un problema compartido por más de medio millón de personas en Suecia. Muchas de ellas desean tener hijos, pero cuando ese deseo no se cumple, la situación puede resultar penosa. Sin embargo, con tecnología moderna y nuevos medicamentos, hoy día muchas de esas personas pueden recibir ayuda.

Puregon®, de Organon, es un compuesto de hormonas foliculostimulantes (FSH) utilizado para estimular la maduración de óvulos de forma controlada. Orgalutran previene una secreción demasiado temprana de la hormona luteinizante (LH).

Este modo de empleo muestra la forma de utilizar Orgalutran. Para Puregon hay a disposición las instrucciones correspondientes.

¿Qué es Orgalutran?

Orgalutran es un antagonista de GnRH. Orgalutran va ya mezclado en una jeringa rellena de antemano. Eso hace que sea fácil de administrar. Orgalutran se administra junto con Puregon y se ofrece en envases de una o cinco jeringas.


¿Cómo se utiliza Orgalutran?

1. Orgalutran se inyecta una vez al día, aproximadamente a la misma hora
2. El médico es el que decide qué día debe comenzar usted a utilizar Orgalutran.
3. Orgalutran se inyecta bajo la piel, por debajo del ombligo. Cambie todos los días el punto de inyección. Utilice distintos puntos de inyección para Puregon y para Orgalutran.
4. El médico o la comadrona le informarán sobre el momento para la última inyección de Orgalutran.


¿Cómo se debe conservar Orgalutran?

Orgalutran es un producto sensible a la luz, por lo que debe conservarse en el envase a la temperatura ambiente. Cuidese de conservarlo fuera del alcance de los niños.


1. Saque el envase con Orgalutran. Controle siempre la solución antes de utilizarla. La solución no debe contener partículas.



2. Orgalutran se debe inyectar bajo la piel. El mejor punto de inyección es el de la piel justo por debajo del ombligo, a la derecha o a la izquierda. No dude en variar el punto del pinchazo de un día para otro. No es necesario desinfectar ese punto.



3. Eleve el punto de inyección apretando la piel entre los dedos pulgar e índice. Agarre la jeringa como un lápiz e introduzca toda la aguja con un pinchazo enérgico perpendicular a la piel, tal como le habrá demostrado su enfermera. Vacíe la jeringa presionando el émbolo de forma lenta y uniforme. Después, saque la aguja y seque el punto de inyección.



Para mayor información sobre el campo de aplicación y los efectos de Orgalutran, vea el prospecto del envase.