

كيفية إعطاء حقن Pregnyl®

لا بد أنك استلمت حزمة Pregnyl التي تحتوي على:

- ٣ أنبولات منفصلة تحتوي على مادة جافة بمقدار ٥٠٠٠ وحدة عالمية بالإضافة إلى ٣ أنبولات منفصلة تحتوي على سائل.
 - علاوةً على ذلك، سوف تحتاج محقن بسعة ٢ ملم وإبرة قرمزية للاستخراج والخلط وأخرى رمادية للحقن.
١. أخرج أنبولتي مواد جافة (بمقدار ١٠٠٠٠ وحدة عالمية) وأنبولة سائل.
 ٢. اضرب برفق أعلى أنبولة السائل بحيث يسقط السائل في القاع. أكسر بعد ذلك الجزء العلوي من الأنبولات.
 ٣. ركب الإبرة القرمزية في المحقن واستخرج السائل من أنبولة السائل.
 ٤. أحقن السائل في أحد الأنبولات الجافة. تأكد من إذابة المسحوق بالكامل.
 ٥. بعد ذلك، اسحب المحلول مرة أخرى. أحقن المحلول في الأنبولة الجافة الأخرى، وتأكد من إذابة المسحوق واسحبه مرةً أخرى في المحقن.
 ٦. اضرب على المحقن برفق لإخراج أي هواء ثم انتقل إلى الإبرة الرمادية.
 ٧. يتم الحقن أسفل الجلد في طبقة دهون البطن بنفس طريقة إعطاء حقن Puregon. قد يسبب هذا الحقن ألماً حاداً و/أو يسبب إحمرار أكثر مما يسببه حقن Puregon.