

Wie Sie sich Ihre Pregnyl® Injektion verabreichen

Sie sollten eine Packung mit Pregnyl erhalten haben, die Folgendes enthält:

- 3 einzelne Trockenampullen mit 5.000 IE + 3 einzelne Ampullen, die eine Flüssigkeit enthalten.
- Zusätzlich benötigen Sie eine 2 ml Spritze, eine pinkfarbene Nadel zum Extrahieren und Mischen, und eine graue Nadel zum Injizieren.

1. Entnehmen Sie 2 Trockenampullen (10.000 IE) und eine Flüssigkeitsampulle.
2. Klopfen Sie auf die Spitze der Flüssigkeitsampulle, sodass die Flüssigkeit auf den Boden sinkt. Brechen Sie dann die Spitzen der Ampullen auf.
3. Befestigen Sie die pinkfarbene Nadel auf der Spritze und extrahieren Sie die Flüssigkeit aus der Flüssigkeitsampulle.
4. Injizieren Sie die gesamte Flüssigkeit in eine der Trockenampullen. Achten Sie darauf, dass sich das Pulver vollständig auflöst.
5. Nun müssen Sie die Lösung nochmals extrahieren. Injizieren Sie die Lösung in die zweite Trockenampulle. Stellen Sie sicher, dass das Pulver aufgelöst ist, und extrahieren Sie es wieder in die Spritze.
6. Klopfen Sie auf die Spritze, um eventuell vorhandene Luft zu entfernen, und tauschen Sie die pinkfarbene gegen die graue Nadel.
7. Die Injektion wird unter die Haut in die Bauchfettschicht gespritzt. Gehen Sie dabei so vor, wie Sie sich Ihre Puregon-Injektion verabreicht haben. Diese Injektion kann schmerzhaft sein und/oder mehr Röte als die Puregon-Injektion verursachen.