

Come somministrare le iniezioni di Pregnyl®

Dovreste aver ricevuto una confezione di Pregnyl contenente:

- 3 fiale di polvere liofilizzata di 5000 UI + 3 fiale di solvente per soluzione iniettabile.
- Una siringa di 2 ml, un ago rosa con cui estrarre e mescolare il prodotto ed un ago grigio per iniettarlo.

1. Estrarre dalla confezione due fiale di polvere liofilizzata (10,000 UI) ed una fiala di solvente.
2. Picchiare la parte superiore del flaconcino in modo che il liquido ricada verso il fondo e spezzare la fiala.
3. Applicare l'ago rosa alla siringa ed estrarre il liquido dalla fiala.
4. Iniettare tutto il liquido in una delle fiale di polvere liofilizzata ed assicurarsi che la polvere si dissolva completamente.
5. Aspirare la soluzione ancora una volta ed iniettarla nell'altra fiala di polvere liofilizzata, assicurarsi che la polvere si dissolva completamente ed aspirare nuovamente il liquido nella siringa.
6. Picchiare la siringa per assicurarsi di espellere tutta l'aria e cambiare l'ago, applicando quello grigio.
7. L'iniezione va fatta sottocute nello strato di adipe addominale nello stesso modo in cui si somministra il Puregon. Questa iniezione può provare senso di bruciore e/o più rossore dell'iniezione di Puregon.