

Kako staviti svoju injekciju Pregnyl®

Paket sa Pregnylom koji ste dobili treba da sadrži:

- 3 zasebne ampule sa suhim materijalom od 5000 IU + 3 zasebne ampule sa tečnošću.
- Osim toga, treba vam špric od 2 ml, bledocrvena igla sa kojom ćete izvlačiti materijal i mešati i siva igla za ubrizgavanje.

- 1.** Izvadite dve ampule sa prahom (10.000 IU) i jednu ampulu sa tečnošću.
- 2.** Potapšite vrh ampule sa tečnošću tako da tečnost padne na dno. Zatim slomite vrh ampula.
- 3.** Stavite bledocrvenu iglu na špric i izvucite tečnost iz ampule sa tečnošću.
- 4.** Ubrižgajte svu tečnost u jednu od ampula sa prahom. Proverite dali se sav prah rastvorio.
- 5.** Zatim ponovo izvucite rastvor. Ubrižgajte rastvor u drugu ampulu sa prahom, proverite dali se sav prah rastvorio, i ponovo izvucite rastvor u špric.
- 6.** Potapšajte ga da izađe vazduh, pa zamenite iglu (stavite sivu).
- 7.** Injekcija se stavlja podkožno u masni sloj na stomaku na isti način kao što se stavlja injekcija Puregon. Ova injekcija može da peče i/ili da prouzrokuje više crvenila nego injekcija Puregon.