

Прегнил® — инструкция по инъекционному

Вы должны были получить упаковку Прегнила, в которой содержатся:

- 1 или 3 ампулы с сухим порошком, содержащие по 5000 МЕ хорионического гонадотропина, и 1 или 3 ампулы с раствором.
 - Для введения вам также понадобится шприц емкостью 2 мл, игла с розовым соединением Люэра для извлечения и смешивания препарата и игла с серым соединением для выполнения инъекции.
1. Возьмите одну ампулу с сухим порошком (5000 МЕ) и одну ампулу с раствором.
 2. Постучите пальцем по головке ампулы с раствором — так, чтобы весь раствор вылился из головки и шейки вниз. Отломите головки ампул.
 3. Подсоедините иглу с розовым соединением к шприцу и извлеките раствор из соответствующей ампулы.
 4. Введите раствор в одну из ампул с сухим веществом. Убедитесь в том, что сухой порошок полностью растворился.
 5. Постучите пальцем по шприцу, удаляя пузырьки воздуха, затем снимите со шприца иглу с розовым соединением и подсоедините иглу с серым соединением.
 6. Раствор вводится инъекционно подкожно в подкожную жировую ткань в области живота. Инъекция Прегнила может оказаться болезненной и/или вызывать более интенсивное покраснение кожи, чем выполненные ранее инъекции.

Если вам назначили Прегнил в дозе 10 000 МЕ, обсудите методику приготовления инъекции с врачом.